

## Déclaration de consentement pour l'exécution d'un acte médical

Médecin responsable de l'information : \_\_\_\_\_

CABINET

CHIRRUGICAL

Vy-Creuse 4  
1260 Nyon

Chirurgien FMH

**Dr Alfred Blaser**

Anc. Médecin-chef chirurgie

FA Chirurgie viscérale  
FA Chirurgie générale et urgences

Tél. 022 362 34 26  
Fax 022 362 34 27  
E-mail [ablaser@me.com](mailto:ablaser@me.com)

Site  
<http://alfredblaser.ch>

Intervention prévue :

**RESECTION RECTO-SIGMOÏDIENNE LAPAROSCOPIQUE OU OUVERTE** \_\_\_\_\_

J'ai été informé(e) aujourd'hui au cours d'un entretien de l'acte médical susmentionné (investigation, opération) qui devra être exécuté sur ma personne. Lors de cet entretien, j'ai reçu les explications relatives à la gravité de mon affection, la nécessité et le degré d'urgence du traitement, le déroulement de l'intervention, d'éventuelles alternatives thérapeutiques (conversion laparoscopie-laparotomie) de même que des indications concernant des maladies actuelles ou passées qui pourraient augmenter les risques liés à l'intervention (tabagisme, diabète, prise de médicaments tel que cortisone...). J'ai également été informé(e) des éventuelles conséquences corporelles, psychiques et professionnelles.

J'ai obtenu des réponses complètes et compréhensibles à toutes mes questions. Toutes ces informations peuvent en tout temps être consultées sur le site internet de l'opérateur.

Le suivi postopératoire sera effectué par le médecin consulté selon les règles en vigueur. Pour cette raison vous bénéficierez à la sortie de la clinique d'un RV de contrôle avec votre chirurgien.

J'ai bien pris connaissance du fait qu'aucune garantie de succès ne peut être donnée et qu'une extension ou une modification de l'intervention prévue reste possible selon les circonstances au moment de l'intervention.

### Complications postopératoires possibles :

Infection de plaie ; hémorragie ; abcès intra-abdominal ; déhiscence anastomotique ; iléus **post-opératoire prolongé** ; **troubles mictionnels** ; **lésion urétérale** ; **lésion de viscères creux (vessie, grêle...) ou pleins (rate)**

La reprise du transit reste individuelle, souvent sous forme d'alternance diarrhées—constipation pendant 2 mois environ.

Avertir l'opérateur en cas d'état fébrile persistant >38°C, d'arrêt du transit ou d'écoulement suspect.

Je confirme avoir eu la possibilité de poser des questions supplémentaires au médecin après l'obtention de ces informations. J'ai bénéficié de suffisamment de temps pour réfléchir en toute tranquillité à ces informations et ainsi donner mon accord pour l'intervention.

Je prie l'opérateur d'informer mes proches au numéro de téléphone ci-dessous dès que l'opération est terminée.

Cette personne de contact (**No. de Tél.**) :

peut être renseignée sur le diagnostic

ne doit pas être renseignée sur le diagnostic

Epoux/se     Soeur/frère     Enfants     autre :

Il n'est **pas nécessaire** de téléphoner

Date de l'entretien

Signature du/de la patient/e ou de son représentant légal

Signature du médecin